

ΑΝΑΤΟΜΙΑ κεφ. 8.1 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

1. Ο σπερματικός πόρος έχει μήκος:

- α) 40- 50 mm
- β) 40- 50 cm
- γ) 4-5 cm
- δ) 4-5 μέτρα

2. Ο ορχις εξωτερικά αποτελείται από:

- α) βλεννώδη κάψα
- β) ορχική κάψα
- γ) σπερματική κάψα
- δ) ινώδη κάψα

3. Τα λόβια της επιδιδυμίδας είναι:

- α) 6-8
- β) 8-10
- γ) 10-12
- δ) 12-14

4. Ο σπερματικός πόρος είναι η συνέχεια:

- α) της ουράς της επιδιδυμίδα
- β) του κάτω πόλου του όρχεως
- γ) της κεφαλής της επιδιδυμίδας
- δ) κανένα από τα ανωτέρω

5. Ο σπερματικός πόρος φτάνει μέχρι:

- α) τη βάση της ουρήθρας
- β) τη βάση του βουβωνικού πόρου
- γ) τη βάση του σπερματικού τόνου
- δ) τη βάση του προστάτη

6. Η ορχική μοίρα του σπερματικού πόρου:

- α) ξεκινά από τον άνω πόλο του όρχεως και φτάνει στον κάτω πόλο
- β) ξεκινά από τον κάτω πόλο του όρχεως και φτάνει στον άνω πόλο
- γ) βρίσκεται στο πλάγιο τοίχωμα της πυέλου
- δ) ξεκινά από τον άνω πόλο του όρχεως και φτάνει μέχρι τη βάση του προστάτη
- ε) κανένα από τα παραπάνω

7. Η κυστική μοίρα του σπερματικού πόρου:

- α) ξεκινά από τον κάτω πόλο του όρχεως και φτάνει μέχρι τη βάση του προστάτη
- β) ξεκινά από τον άνω πόλο του όρχεως και φτάνει μέχρι τη βάση του προστάτη
- γ) βρίσκεται πίσω από την ουροδόχο κύστη
- δ) φτάνει μέχρι το έξω στόμιο του βουβωνικού πόρου
- ε) α+γ

8. Η επιδιδυμίδα βρίσκεται στο:

- α) κάτω και στο πίσω χείλος του όρχεως
- β) άνω και στο πίσω χείλος του όρχεως
- γ) κάτω και στο μπροστινό χείλος του όρχεως
- δ) άνω και στο μπροστινό χείλος του όρχεως

9. Τα σπερματοζωάρια παράγονται:

- α) στη διάμεση ουσία του όρχεως
- β) από τα διάμεσα κύτταρα του όρχεως
- γ) από το δίκτυο Haller του όρχεως
- δ) από τα σπερματικά σωληνάκια του όρχεως
- ε) κανένα από τα παραπάνω

10. Ο σπερματικός τόνος περιλαμβάνει :

- α) την ορχική, και την τονική μοίρα του σπερματικού πόρου
- β) την τονική, και την βουβωνική μοίρα του σπερματικού πόρου
- γ) την βουβωνική μοίρα και την πυελική μοίρα του σπερματικού πόρου
- δ) την ορχική, την τονική, και την βουβωνική μοίρα του σπερματικού πόρου

11. Ποια μοίρα του σπερματικού πόρου βρίσκεται εσωτερικά από τη σπερματοδόχο κύστη:

- α) η κυστική
- β) η πυελική
- γ) η βουβωνική
- δ) η τονική
- ε) καμία από τις παραπάνω

12. Ο εκσπερματικός πόρος σχηματίζεται από την ένωση:

- α) σπερματοδόχου κύστης και προστάτη
- β) προστάτη και κυστικής μοίρας του σπερματικού πόρου
- γ) σπερματοδόχου κύστης και σπερματικού πόρου
- δ) όλων των ανωτέρω

13. Στα πλάγια ποιας μοίρας της σπονδυλικής στήλης, βρίσκονται οι όρχεις στην εμβρυική ζωή:

- α) της ιερής
- β) της οσφυϊκής
- γ) της κοκκυγικής
- δ) καμίας από τις παραπάνω

14. Ο εκσπερματικός πόρος έχει μήκος:

- α) 2cm
- β) 4cm
- γ) 6cm
- δ) 8cm