

ΑΝΑΤΟΜΙΑ κεφ. 8.2

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

1. Στα έξω γεννητικά όργανα δεν περιλαμβάνεται:

- α) το αιδοίο
- β) ο πρόδομος του κολεού
- γ) οι βολβοί του προδόμου
- δ) ο κολεός

2. Οι ωοθήκες βρίσκονται:

- α) στα πλάγια τοιχώματα της μεγάλης πυέλου
- β) στα πίσω τοιχώματα της μικρής πυέλου
- γ) στα πλάγια τοιχώματα της μικρής πυέλου
- δ) ελεύθερες μέσα στη μικρή πυέλο

3. Τα άωρα ωοθυλάκια περιέχονται στη:

- α) μυελώδη ουσία
- β) φλοιώδη ουσία
- γ) βλαστικό επιθήλιο
- δ) σε όλα τα ανωτέρω

4. Το πάνω άκρο της ωοθήκης ακουμπά:

- α) την μήτρα
- β) το θόλο του κόλπου
- γ) το αρχικό τμήμα της σάλπιγγας
- δ) το αιδοίο

5. Το κοιλιακό στόμιο της σάλπιγγας βρίσκεται:

- α) στη γωνία της κοιλότητας της μήτρας
- β) στο όριο μεταξύ ληκύθου και κώδωνα
- γ) στο όριο μεταξύ ισθμού και ληκύθου
- δ) κανένα από τα παραπάνω

6. Με το έσω στόμιο της μήτρας επικοινωνούν:

- α) το σώμα της μήτρας με τον τράχηλο
- β) το σώμα της μήτρας με τη σάλπιγγα
- γ) ο τράχηλος με τον κόλπο
- δ) ο ενδοτραχηλος με τον κόλπο

7. Ο ισθμός της μήτρας αντιστοιχεί:

- α) στο έξω στόμιο της μήτρας
- β) στο έσω στόμιο της μήτρας
- γ) στον πυθμένα της μήτρας
- δ) κανένα από τα παραπάνω

8. Η γονιμοποίηση γίνεται:

- α) στην ωοθήκη
- β) στη σάλπιγγα
- γ) στη μήτρα
- δ) στον κόλπο

9. Περιβάλλει τον τράχηλο της μήτρας το:

- α) σώμα του κόλπου
- β) κάτω άκρο του κόλπου
- γ) άνω άκρο του κόλπου
- δ) όλα τα παραπάνω

10. Η μήτρα βρίσκεται:

- α) πίσω από την ουροδόχο κύστη
- β) πίσω από το ορθό
- γ) μπροστά ουροδόχο κύστη
- δ) κανένα από τα παραπάνω

11. Προς τα εμπρός τα μικρά χείλη του αιδοίου περιβάλλουν:

- α) την ουρηθραία θηλή
- β) τον πρόσθιο σύνδεσμο των μεγάλων χειλέων
- γ) την κλειτορίδα
- δ) τον οπίσθιο σύνδεσμο των μικρών χειλέων

12. Η ουρηθραία θηλή βρίσκεται

- α) πίσω από την κλειτορίδα
- β) στον πρόσθιο σύνδεσμο των μεγάλων χειλέων
- γ) μπροστά από την κλειτορίδα
- δ) στον οπίσθιο σύνδεσμο των μικρών χειλέων

13. Κατά την εμβρυική ζωή σχηματίζονται:

- α) πρωτογενή ωοθυλάκια
- β) δευτερογενή ωοθυλάκια
- γ) ώριμα ωοθυλάκια
- δ) Όλα τα ανωτέρω

14. Μετά την ωοθυλακιορρηξία, το ωοθυλάκιο μετατρέπεται στην αρχή σε

- α) ωχρό σωματίο
- β) κίτρινο σωματίο
- γ) ερυθρό σωματίο
- δ) λευκό σωματίο

15. Η παραγωγική φάση του ωοθυλακικού κύκλου, ρυθμίζεται κυρίως από:

- α) τα οιστρογόνα
- β) την προγεστερόνη
- γ) το ωχρό σωματίο
- δ) την τεστοστερόνη

16. Η εκκριτική φάση του ωοθυλακικού κύκλου:

- α) αρχίζει με την έναρξη της περιόδου
- β) ρυθμίζεται από τα οιστρογόνα
- γ) ρυθμίζεται από την προγεστερόνη
- δ) διαρκεί όσο η έμμηνος ρύση

17. Η κύηση διαρκεί φυσιολογικά :

- α) 35 εβδομάδες
- β) 40 εβδομάδες
- γ) 45 εβδομάδες
- δ) 50 εβδομάδες

18. Μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου το ωχρο σωματίο της ωθήκης:

- α) μετατρέπεται σε λευκό σωματίο
- β) μετατρέπεται σε ερυθρό σωματίο
- γ) παραμένει ωχρο σωματίο
- δ) κανένα από τα ανωτέρω

19. Το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται:

- α) στον ενδοτράχηλο
- β) στο ενδομήτριο
- γ) στον πλακούντα
- δ) στη λήκυθο

20. Τα χείλη της ωθήκης είναι:

- α) το μέσα και το έξω
- β) το άνω και το κάτω
- γ) το πίσω και το μπροστά
- δ) το μητριάιο και το κοιλιακό

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ