

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

κεφ. 9 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

1. Η θυροξίνη παράγεται από:

- α) απόφυση β) θυρεοειδή γ) θύμο δ) παραθυρεοειδή

2. Οι παραθυρεοειδείς αδένες παράγουν:

- α) θυροξίνη β) τριωδοθυρονίνη
γ) παραθορμόνη δ) παραθυμίνη

3. Συγγενής απλασία ή αφαίρεση του θύμου κατά την εμβρυϊκή ζωή οδηγεί σε:

- α) αναιμία β) λευκοκυττάρωση
γ) λεμφοπενία δ) υπεραιμία

4. Η ωκυτοκίνη παράγεται από:

- α) θυρεοειδή β) πρόσθιο λοβό της υπόφυσης
γ) θύμο δ) οπίσθιο λοβό της υπόφυσης

5. Το πάγκρεας παράγει:

- α) πιτρεσίνη β) γλυκαγόνο γ) θυμοσίνη δ) θυροξίνη

6. Ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης παράγει:

- α) πιτρεσίνη β) γλυκαγόνο γ) θυμοσίνη δ) θυροξίνη

7. Η ωκυτοκίνη δρα:

- α) στο θύμο β) στο θυρεοειδή γ) στο πάγκρεας δ) στη μήτρα

8. Η ADH δρα:

- α) στη μήτρα β) στα νεφρά
γ) στους μαστούς δ) στον παραθυρεοειδή

9. Η γλυκαγόνη παράγεται από:

- α) τα κύτταρα α του παγκρέατος β) το ήπαρ
γ) τα κύτταρα β του παγκρέατος δ) τα επινεφρίδια

10. Τα νησίδια του Langerhans βρίσκονται:

- α) στο θύμο β) στην υπόφυση γ) στο πάγκρεας δ) στις ωοθήκες

11. Τα κύτταρα β του παγκρέατος παράγουν:

- α) ινσουλίνη β) παγκρεατικό υγρό γ) γλυκογόνο δ) χολή

12. Η ινσουλίνη παράγεται από:

- α) τα κύτταρα α του παγκρέατος β) το ήπαρ
γ) τα κύτταρα β του παγκρέατος δ) τα επινεφρίδια

13. Τα επινεφρίδια βρίσκονται στο ύψος του:

- α) δωδέκατου οσφυϊκού σπόνδυλου
- β) ενδέκατου οσφυϊκού σπόνδυλου
- γ) δεύτερου οσφυϊκού σπόνδυλου
- δ) πρώτου οσφυϊκού σπόνδυλου

14. Η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη εκκρίνεται από:

- α) τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης
- β) το θύμο
- γ) το θυρεοειδή
- δ) τους παραθυρεοειδείς

15. Ελάττωση της πυκνότητας του ασβεστίου στο αίμα:

- α) προκαλεί μείωση έκκρισης της παραθορμόνης
- β) προκαλεί αύξηση έκκρισης της παραθορμόνης
- γ) δεν επηρεάζει την έκκριση της παραθορμόνης
- δ) κανένα από τα παραπάνω

16. Ο θύμος αδένας:

- α) εκκρίνει τη θυμοσίνη
- β) εκκρίνει μια λεμφοτρόπο ορμόνη
- γ) συμμετοχή στο ανοσολογικό σύστημα
- δ) όλα τα ανωτέρω