

**Κεφ. 5.1 – 5.3**

Ασχολούμαστε με το Σ/Λ αφού μελετήσουμε το αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου ψάχνοντας τις σωστές απαντήσεις

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

**ΓΕΝΙΚΑ - Κεφ. 5.1     Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ**

1. Οι μεγάλοι αδένες του πεπτικού συστήματος, βρίσκονται στο τοίχωμα του πεπτικού σωλήνα.
2. Η στοματική κοιλότητα χωρίζεται με τους φραγμούς των δοντιών σε 2 μοίρες: την έξω, και το προστόμιο.
3. Το έσω τοίχωμα του προστομίου, σχηματίζεται από τα δόντια και τα ούλα.
4. Η κυρίως στοματική κοιλότητα σχηματίζεται, από πίσω από την υπερώα, ενώ από κάτω από το έδαφος του στόματος.
5. Η γλώσσα εμφανίζει δυο επιφάνειες, την πάνω και την κάτω , και απαρτίζεται από δυο μέρη: την βάση η ρίζα και την κορυφή.
6. Η κάτω επιφάνεια της γλώσσας έχει πολλές προεξοχές: τις θηλές της γλώσσας.
7. Οι τριχοειδείς θηλές της γλώσσας είναι οι περισσότερες.
8. Οι φυλλοειδείς θηλές της γλώσσας σχηματίζουν το γευστικό λάμδα.
9. Οι τριχοειδείς οι μυκητοειδείς και φυλλοειδείς θηλές της γλώσσας, έχουν γευστικούς κάλυκες.
10. Το ξινό και το αλμυρό τα αντιλαμβανόμαστε στα πλάγια, ενώ το πικρό στο πίσω μέρος της γλώσσας.
11. Η σκληρή υπερώα σχηματίζεται από υπερώιο οστό, και την άνω γνάθο.
12. Η μαλακή υπερώα δεν έχει οστά.
13. Η σταφυλή ανήκει στη σκληρή υπερώα.
14. Τα μόνιμα δόντια είναι 34, ενώ τα νεογιλά 20.
15. Η μύλη, είναι το τμήμα του δοντιού που φαίνεται μέσα στη στοματική κοιλότητα.
16. Η ρίζα, είναι το τμήμα του δοντιού που βρίσκεται μέσα στο οστό.
17. Ο υπογνάθιος αδένας είναι ο μεγαλύτερος από τους σιελογόνους αδένες.

18. Ο υπογνάθιος αδένας και ο υπογλώσσιος αδένας, εκβάλουν κάτω από τη γλώσσα.
19. Η παρωτίδα εκβάλλει με 2 πόρους στο προστόμιο, ο ένας απέναντι από τη μύλη του 2 άνω γομφίου και ο δεύτερος απέναντι από τη μύλη του 3 άνω γομφίου.

### **Κεφ. 5.2 ΦΑΡΥΓΓΑΣ - ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ**

20. Ο φάρυγγας είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους 25cm.
21. Ο φάρυγγας είναι και αμυντικό όργανο.
22. Ο φάρυγγας χωρίζεται σε 3 μοίρες: τη ρινική, τη στοματική και την τραχηλική.
23. Ο οισοφάγος χωρίζεται σε 4 μοίρες: την τραχηλική, τη θωρακική, τη διαφραγματική και την κοιλιακή.
24. Ο οισοφάγος πορεύεται μπροστά από τη σπονδυλική στήλη.
25. Ο οισοφάγος εξυπηρετεί ταυτόχρονα το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστημα.

### **Κεφ. 5.3 ΣΤΟΜΑΧΙ - ΕΝΤΕΡΟ**

26. Δεξιά του στομάχου βρίσκεται το συκώτι, αριστερά ο σπλήνας.
27. Το στομάχι εμφανίζει 2 στόμια: το οισοφαγικό και το καρδιακό.
28. Η μορφή του στομάχου, εμφανίζει μεγάλες ποικιλίες στο ίδιο άτομο κατά τις διάφορες ώρες της ημέρας.
29. Η θέση του στομάχου, δεν αλλάζει (δεν εμφανίζει μεγάλες ποικιλίες) στο ίδιο άτομο κατά τις διάφορες ώρες της ημέρας.
30. Ο μυϊκός τόνος του στομάχου, δεν επηρεάζει τη μορφή του στομάχου.
31. Ο υποτονικός στόμαχος εμφανίζεται επιμήκης, ενώ ο ορθοτονικός σε σχήμα J.
32. Το στομάχι στηρίζεται στη θέση του μόνο με τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο.
33. Οι 4 χιτώνες του στομάχου από μέσα προς τα έξω είναι: ο βλεννογόνος, ο υποβλεννογόνιος, ο μυϊκός και ο ορογόνος.
34. Στο μυϊκό χιτώνα του στομάχου βρίσκονται οι γαστρικοί αδένες.
35. Κάτω από το στομάχι βρίσκεται το λεπτό και το παχύ έντερο.
36. Τα βλεννώδη κύτταρα του στομάχου παράγουν το ενζυμο πεψίνη.

- 37.** Τα καλυπτήρια κύτταρα του στομάχου παράγουν την ορμόνη γαστρίνη.
- 38.** Η υπερβολική έκκριση γαστρικών οξέων, αποτελεί παράγοντα δημιουργίας έλκους του στομάχου.
- 39.** Το μήκος του λεπτού εντέρου φτάνει τα 7 μέτρα.
- 40.** Το λεπτό έντερο ξεκινά από τον πυλωρό, και φτάνει μέχρι τη νηστιδωδεκαδακτυλική καμπή.
- 41.** Στον αυλό του δωδεκαδακτύλου, εκβάλλουν οι εκφορητικοί πόροι του συκωτιού και του παγκρέατος.
- 42.** Οι λάχνες είναι λεπτές εσοχές του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου.
- 43.** Οι πλάκες peyer είναι επάρματα του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου.
- 44.** Το μεσεντέριο είναι πτυχή του περιτοναίου. Από αυτό κρέμεται το ελκώδες έντερο.
- 45.** Το παχύ έντερο ξεκινά από την ειλεοτυφλική βαλβίδα, και έχει μήκος 1.5 μέτρα.
- 46.** Το λεπτό έντερο περιβάλλει το παχύ έντερο.
- 47.** Ο βλεννογόνος του παχέως εντέρου δεν έχει λάχνες και πλάκες peyer.
- 48.** Στο παχύ έντερο γίνεται απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών.
- 49.** Τα μικρόβια του παχέως εντέρου βοηθούν στη διαδικασία της πέψης. Αν η εντερική χλωρίδα του εντέρου καταστραφεί προκαλείται δυσκοιλιότητα.
- 50.** Η σκωληκοειδής απόφυση βρίσκεται στο τυφλό, και έχει μήκος 2-3 cm.
- 51.** Η σκωληκοειδής απόφυση εμφανίζει 2 μέρη: τη βάση και τη κορυφή.
- 52.** Η σκωληκοειδής απόφυση, αν και είναι όργανο αμυντικό, το τοίχωμα της είναι φτωχό σε λεμφικό ιστό.