

Χορήγηση φαρμάκων από το στόμα

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ87.02



Υλικά που απαιτούνται

- ▶ Δίσκος φαρμάκων που περιέχει:
 - Ποτηράκια φαρμάκων ογκομετρημένα
 - Ποτηράκια μιας χρήσης
 - Καρτάκια χρωματιστά
 - Φάρμακα ασθενών

Διαδικασία

- ▶ Ετοιμάστε τα φάρμακα του κάθε ασθενή στο χώρο του τμήματος όπου βρίσκεται το φαρμακείο
- ▶ Τοποθετήστε τα στο δίσκο φαρμάκων
- ▶ Φροντίστε να μη σας διακόψει κανείς κατά την ετοιμασία των φαρμάκων για να αποφύγετε λάθη
- ▶ Πάρτε τα ντοσιέ με τα φύλλα νοσηλείας των ασθενών και ελέγξτε τα φάρμακα συγκρίνοντας τις κάρτες με τις ιατρικές οδηγίες
- ▶ Πλύντε τα χέρια σας
- ▶ Τοποθετήστε τις κάρτες φαρμάκων με τη σειρά των ασθενών του κάθε θαλάμου - αν οι κάρτες κάθε ασθενή είναι περισσότερες από μία τις διατηρείτε μαζί

Διαδικασία

- ▶ Διαβάστε το φάρμακο 3 φορές:
 - Όταν το παίρνετε από το φαρμακείο
 - Όταν το βάλετε στο ποτηράκι
 - Πριν το επιστρέψετε στο φαρμακείο
- ▶ Μην πιάνετε με τα χέρια σας το φάρμακο αν είναι ταμπλέτα ή κάψουλα - βάζετε την καθορισμένη δόση κατευθείαν στο ποτηράκι
- ▶ Μετρήστε σωστά τις σταγόνες - τις βάζετε στο ποτηράκι φαρμάκων με λίγο νερό
- ▶ Αν το φάρμακο είναι εναιώρημα ανακινήστε το μπουκάλι πριν το βάλετε στο ποτηράκι φαρμάκων
- ▶ Τα μπουκάλια πρέπει να διατηρούνται καθαρά - φροντίστε να μη λερώσετε τις ετικέτες, να καθαρίζετε καλά τα χείλη του μπουκαλιού και στο τέλος να εφαρμόζετε καλά το πώμα

Διαδικασία

- ▶ Αφού τελειώσετε την ετοιμασία των φαρμάκων, ελέγξτε την ώρα και αρχίστε τη χορήγησή τους στους ασθενείς
- ▶ Απομακρύνετε τους επισκέπτες από το θάλαμο
- ▶ Ενημερώστε τον ασθενή για το είδος, τη δόση και το αποτέλεσμα που θα έχει το φάρμακο που του χορηγείτε
- ▶ Βάλτε στο κομοδίνο του ασθενή ένα ποτήρι νερό
- ▶ **Βεβαιωθείτε για την ταυτότητα του ασθενή:**
 - Ελέγξτε το όνομά του στην ταυτότητα στο χέρι
 - Ελέγξτε το όνομά του στο διάγραμμά του αν είναι μέσα στο θάλαμο
 - **Καλέστε τον με το όνομά του για να κάνετε επαλήθευση**

Διαδικασία

- ▶ Κατά τη χορήγηση φαρμάκων σε έναν ασθενή μην αφήνετε το δίσκο στο τραπέζι θαλάμου αλλά σε μέρος όπου μπορείτε να τον ελέγξετε - Υπάρχει κίνδυνος άλλος ασθενής να πάρει λάθος φάρμακα
- ▶ Τα φάρμακά του ο ασθενής τα παίρνει μπροστά σας πριν απομακρυνθείτε από αυτόν - ο ασθενής μπορεί να τα συγκεντρώσει και να τα πάρει όλα μαζί ή να τα πετάξει ή να τα δώσει σε άλλον ασθενή
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ φάρμακα στο κομοδίνο του ασθενή
- ▶ Βοηθήστε τον κλινήρη ασθενή να πάρει καθιστή ή ημικαθιστή θέση για να πάρει τα φάρμακά του - έτσι προλαμβάνεται εισρόφηση και ο πνιγμός
- ▶ Όταν χορηγείτε υπογλώσσια φάρμακα εξηγήστε στον ασθενή ότι πρέπει να το τοποθετήσει κάτω από τη γλώσσα και δεν πρέπει να πει νερό ούτε να τα καταπιεί

Διαδικασία

- ▶ Αν ο ασθενής έχει ρινογαστρικό σωλήνα και το φάρμακο είναι ταμπλέτα, τη θρυμματίζετε και τη διαλύετε με νερό σε ποτηράκι φαρμάκων - χορηγείτε το φάρμακο με σύριγγα μέσα από το ρινογαστρικό σωλήνα - με σύριγγα χορηγείτε και τα φάρμακα σε υγρή μορφή (κατευθείαν στο ρινογαστρικό σωλήνα)
- ▶ Επιστρέψτε το δίσκο φαρμάκων στη θέση του και αφήστε τον καθαρό και τακτοποιημένο
- ▶ Αν κάποιο φάρμακο δεν δόθηκε στον ασθενή και πρέπει να δοθεί αργότερα το αφήνετε στο δίσκο
- ▶ Ενημερώνετε το φύλλο νοσηλείας:
 - Τσεκάρετε τα φάρμακα που χορηγήσατε
 - Γράφετε γιατί ο ασθενής δεν πήρε το φάρμακο
 - Σημειώστε την έναρξη νέων φαρμάκων και ανοίξτε καρτάκια
 - Σημειώστε τη διακοπή φαρμάκων

Χορήγηση φαρμάκων με κινητό φαρμακείο

- ▶ Αποτελείται από ντουλάπι που κλειδώνει στο πάνω μέρος
- ▶ Μέσα στο ντουλάπι υπάρχουν θήκες, όπου τοποθετούνται φάρμακα με τη συσκευασία τους και με αλφαβητική σειρά
- ▶ Υπάρχουν: ποτηράκια φαρμάκων ογκομετρημένα και κουταλάκια μιας χρήσης
- ▶ Στο κάτω μέρος τοποθετείτε: κανάτα με νερό, ποτηράκια μιας χρήσης και χαρτοβάμβακο ή χαρτομάντηλα
- ▶ Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν μαζί με το κινητό φαρμακείο τα φύλλα νοσηλείας των ασθενών
- ▶ Η ετοιμασία και χορήγηση φαρμάκων γίνεται μέσα στο θάλαμο του ασθενή

7. Στο τέλος της ετοιμασίας τα φαικελάκια με το φάρμακο μπαίνουν σε ειδικό δίσκο με θήκες χωρισμένες κάθετα και οριζόντια όπου αναγράφονται οι ώρες και οι θάλαμοι





Dosing Cup



Oral syringe
with colored cap



Dosing Spoons



Medicine Dropper



Oral dosing syringe for infants

ΟΔΟΙ	Πώς χορηγείται το φάρμακο	Περιγραφή οδού
Στόμα	Ο άρρωστος καταπίνει το φάρμακο	Από το στόμα-per os
Ανώτερη αναπνευστική	Ο άρρωστος εισπνέει το φάρμακο spray	Εισπνοή – inh
Παρεντερική (ενέσεις)	<u>Το φάρμακο εισάγεται στον</u> Υποδόριο ιστό Μυϊκό ιστό ↔ Δέρμα Φλέβα Αρτηρία Μυοκάρδιο Περιτοναϊκή κοιλότητα Μυελικό σωλήνα	<u>Χορήγηση με ένεση</u> Υποδόρια-SC Ενδομυϊκή-IM Ενδοδερμική-ID Ενδοφλέβια-IV Ενδοαρτηριακή-IA Ενδοκαρδιακή Ενδοπεριτοναϊκή Ενδοραχιαία
Δέρμα – Βλεννογόνοι ↓ Επάλειψη - Επίτριψη	<u>Το φάρμακο εισάγεται</u> Κόλπο Ορθό Κάτω από τη γλώσσα Τοποθετείται στο βλεννογόνο	<u>Χορήγηση</u> Κολπικά-PV Ορθό-PR Υπογλώσσια-SL Ενστάλαξη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ (PER OS)

Τα φάρμακα πρέπει πάντοτε να μένουν στη συσκευασία που κυκλοφορούν για να μην αλοιώνονται.

Οι μορφές των φαρμάκων που χορηγούνται:

- Κάψουλες -capsules caps
- Δισκία- tablets tabs
- Δισκία σακχαρόπηκτα - tablets sugar coated
- Δισκία αναβράζοντα- tablets effervescent
- Δισκία υπογλώσσια-tablets sublingual
- Σταγόνες-drops
- Σκονάκια ή κόνεις-powder
- Σιρόπια-syrup
- Ελιξήρια-elixir
- Εναιωρήματα-suspension
- Πόσιμες ampoules- ampoules buvables

- ▶ Αλοιφή - ointment
- ▶ Εισπνεόμενο-inhaler inh
- ▶ Αεροζόλ για εισπνοή-aerosol
- ▶ Δηλητήριο-poison
- ▶ Δισκία που εμφυτεύονται κάτω από το δέρμα-pellets
- ▶ Υπόθετα ορθού - suppositories supp
- ▶ Υπόθετα κόλπου-onvules
- ▶ Υποδόρια ένεση -Subcutaneous SC
- ▶ Ενδομυϊκή ένεση-Intramuscular IM
- ▶ Ενδοδερμική ένεση -Intradermal ID
- ▶ Ενδοφλέβια ένεση -intravenous IV

- Εναιώρημα είναι υγρό σκεύασμα φαρμάκων το οποίο αποτελείται από νερό και βελτιωτικές ουσίες, μέσα στο οποίο αιωρείται το κυρίως φάρμακο αδιάλυτο (τα ελαφρά είναι πάνω, τα βαρύτερα καθιζάνουν).

α/α	ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΔΟΣΗ	ΩΡΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ
301	Παπαδάκη Ελένη	Salospir 100 mg Flagyl 800 mg Depon	1x1 (tabl) 1x2 (caps) 1x1 (tabl)	8 8 - 8	Μετά φαγητού
302	Χατζή Ζωή	Digoxin Aludtox Εναιώρημα Legofer am	1/2x1 (table) 10 cc x 2 1x1 amp	2 8 - 8 2	Μετά από μέτρηση Α.Π. Προ φαγητού
	Τσοῦτσα Εὐη	Salospir 325 mg Vomex sup	1x3 1x1 sup	8 - 2 - 10	Μετά από ερώτηση
303	Κανέλη Δήμητρα	Aerolin μάσκα Flortil drops	1x2 10 drops x 2	8 - 8 8 -8	