

Τμήμα: Γ' Υγείας

Μάθημα: Υγιεινή

Ενότητα: 4.5.4. Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Ερωτήσεις – Απαντήσεις Τράπεζας

23451

Θέμα 4ο

4. Υπάρχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που μεταδίδονται από τη μητέρα-φορέα στο έμβρυο ή το νεογνό.

α) Ποια θα μπορούσε να είναι η ιατρική συμβουλή σε μια έγκυο μητέρα που πάσχει από σύφιλη και βρίσκεται στον τρίτο μήνα της κύησης;

β) Ποιο το μέτρο προφύλαξης σε ένα νεογνό που η μητέρα του πάσχει από βλεννόρροια (γονοκοκκική ουρηθρίτιδα).

α) Θεραπεία της κυοφορούσας συφιλιδικής μητέρας για την προστασία του εμβρύου άμεσα, καθώς το έμβρυο μολύνεται μέσω του πλακούντα μετά τον 4^ο μήνα της κύησης.

β) Ενστάλαξη κολλυρίου νιτρικού αργύρου ή πενικιλίνης στα μάτια των νεογνών, αμέσως μετά τον τοκετό.

22869

Θέμα 2ο

2.1 Η μετάδοση ενός λοιμώδους νοσήματος με σταγονίδια όπως φτέρνισμα, βήχας και με δάγκωμα όπως η λύσσα, τι είδους τρόπος μετάδοσης είναι; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

2.2

α) Δώστε τέσσερα παραδείγματα λοιμωδών νοσημάτων σεξουαλικά μεταδιδόμενα.

β) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συχνότητα των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων;

2.1 Και στις δύο περιπτώσεις η μετάδοση είναι άμεση επειδή η μεταφορά ενός μικροοργανισμού γίνεται χωρίς να παρεμβάλλεται τίποτα.

2.2

α) Νοσήματα σεξουαλικά μεταδιδόμενα είναι : η σύφιλη, η βλεννόρροια, η ηπατίτιδα Β, C, το AIDS, ο έρπης των γεννητικών οργάνων, τα χλαμύδια κ.λπ.

β) Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα των Σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι:

- i. Άτομα με ασυμπτωματική νόσο (βλεννόρροια).
- ii. Συχνή αλλαγή ερωτικών συντρόφων.
- iii. Πρώιμη έναρξη της ερωτικής ζωής.
- iv. Αντικατάσταση του ελαστικού προφυλακτικού από τα αντισυλληπτικά χάπια.
- v. Μετακίνηση πληθυσμών.
- vi. Αποτυχία θεραπευτικής αγωγής.
- vii. Άτομα που εκδίδονται και δεν ελέγχονται από το κράτος.
- viii. Η νόσηση του ενός ερωτικού συντρόφου και η μετάδοση στον άλλον.
- ix. Άγνοια.

23458

Θέμα 4ο

4. Δύο λοιμογόννοι παράγοντες ο ιός της γρίπης και ο γονόκοκκος που προκαλεί βλεννόρροια χρησιμοποιώντας ο καθένας το μέγιστο χρονικό διάστημα επώασής τους,

α) θα εμφανίσουν ταυτόχρονα τα συμπτώματα της αντίστοιχης νόσου; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

β) Ποια συμπτώματα παρουσιάζουν οι αντίστοιχες ασθένειες;

γ) Ποια τα μέτρα προφύλαξης για τον ιό της γρίπης;

Θέμα 4ο

α) Ο ιός της γρίπης έχει χρόνο επώασης 1 έως 3 μέρες, ενώ ο γονόκοκκος 1 έως 7 μέρες. Επομένως το πιθανότερο είναι να εμφανιστούν πρώτα τα συμπτώματα που προκαλεί ο ιός της γρίπης, επειδή ο χρόνος επώασής του (περίοδος από την είσοδο

του μικροοργανισμού στον οργανισμό μέχρι και την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου) είναι μικρότερος.

β) Τα συμπτώματα της γρίπης είναι απότομα και έντονα :

- i. ο υψηλός πυρετός,
- ii. τα ρίγη,
- iii. η κακουχία,
- iv. οι μυϊκοί πόνοι,
- v. οι πόνοι στις αρθρώσεις και
- vi. με συμπτώματα στο αναπνευστικό σύστημα.

Τα συμπτώματα στη βλεννόρροια από το γονόκοκκο είναι:

i. η δυσουρία,

ii. αίσθημα καύσου κατά την ούρηση,

iii. πυώδεις κιτρινοπράσινες εκκρίσεις με δυσάρεστη οσμή.

iv. Η βλεννόρροια σε μεγάλο ποσοστό είναι ασυμπτωματική στις γυναίκες.

γ) Ο εμβολισμός κατά της γρίπης είναι ένα από τα σπουδαιότερα προληπτικά μέτρα. Ο εμβολιασμός γίνεται το φθινόπωρο και διαρκεί ένα χρόνο. Συνιστάται σε άτομα της τρίτης ηλικίας (άνω των 65 ετών), σε ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα του αναπνευστικού κ.λπ., σε γιατρούς και νοσηλευτές, που έρχονται σε συχνή επαφή με αρρώστους.