
Φυσική


Ερωτήσεις σελ. 63

11.



επιτάχυνση = κλίση της ευθείας = $\varepsilon\varphi\theta = \frac{\Delta u}{\Delta t}$


12.



Η ταχύτητα ισούται με την κλίση της καμπύλης στο διάγραμμα x–t

κλίση: αυξάνεται ⟹ αυξάνεται η ταχύτητα


13.



$S = E_{γραφ} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = 25m$ ✓

δίνεται η απόσταση


14.



$\alpha_A = \varepsilon\varphi\theta_A$

$\alpha_B = \varepsilon\varphi\theta_B$

$\theta_A > \theta_B \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\theta_A > \varepsilon\varphi\theta_B \Leftrightarrow \alpha_A > \alpha_B$



Για το ίδιο Δt

$E_A > E_B \Leftrightarrow \Delta x_A > \Delta x_B$ ή $S_A > S_B$

20. $\alpha = \frac{\Delta u}{\Delta t} = \frac{1\,m/s}{1s} = 1\,\frac{m}{s^2}$

(Γ) Η ταχύτητα μεταβάλλεται κατά 1m/s σε κάθε 1s (σε κάθε δευτερόλεπτο)
⟺ επιτάχυνση ίση με $1m/s^2$ (κατά μέτρο)

21. (Β)

η ταχύτητα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό (επειδή σταθερής διεύθυνσης κίνηση)
ευθύγραμμα επιταχυνόμενη κίνηση

22. (Β)

ευθυγρ. επιτάχ. με $u_0 = 0$

$S = \Delta x = \frac{1}{2}\alpha \Delta t^2$

$S = \frac{1}{2}\alpha t^2$

διάγραμμα ανάλογο του t^2


23. Α. Σωστό

Β. Λάθος

Γ. Λάθος

24. Α. ευθυγρ. επιταχυνόμ. Β. ευθυγρ. ομαλή Γ. ευθυγρ. επιβραδυνόμενη

Ερωτ. 27 σελ. 66



υ: αυξάνεται ⇒ επιταχυνόμενη κίνηση

ΑΛΛΑ δεν αυξάνεται με σταθερό ρυθμό

η κλίση της καμπύλης μειώνεται ⇒ α: φθίνουσα

δεν είναι ομαλά επιταχ. κίνηση

Μεγαλύτερη κλίση = μεγαλύτερη επιταχ. στην t_1


σελ. 69
αδκ. Γ

$\upsilon_0 = 0\,m/s$
$\alpha = 2\,m/s^2$

Α. $\upsilon = \alpha t = 2\frac{m}{s^2} \cdot 15s = 30\,m/s$

Β. $S = \Delta x = \frac{1}{2}\alpha t^2 = \frac{1}{2}\cdot 2\frac{m}{s^2}(15s)^2 = 225\,m$

αδκ. 8



$\alpha = \frac{\Delta\upsilon}{\Delta t} = \varepsilon\varphi\theta = \frac{20}{10} = 2\,m/s^2$

Α. $S = \Delta x = \mathcal{E}_{τραπ.} = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 20 = 100\,m$


Β. 2ο δευτερόλεπτο κίνηση από 1s μέχρι 2s ⇒ $\Delta t = (2-1)s = 1s$

$\upsilon_1 = \alpha\cdot t_1 = 2\frac{m}{s^2}\cdot 1s = 2\frac{m}{s}$

$\Delta x = \upsilon_1\cdot\Delta t + \frac{1}{2}\alpha\Delta t^2$


$= 2\frac{m}{s}(2-1)s + \frac{1}{2}\cdot 2\frac{m}{s^2}\left[(2-1)s\right]^2 = (2+1)\,m = 3\,m$

$\upsilon_2 = \alpha\cdot 2 = 4\frac{m}{s}$ (t_2)



$\Delta x = \mathcal{E}_{τραπ.} = \frac{(4+2)\cdot 1}{2} = 3m$ ✓

αδκ. 9



Α. $S = \mathcal{E}_{τραπ.} = \frac{(30+10)\cdot 20}{2} = 400m$

$\mathcal{E}_{τραπ.} = \frac{(B+b)\cdot ύψος}{2}$

Β. $\upsilon_μ = \frac{S}{\Delta t_{ολ}} = \frac{400m}{30s} = \frac{40}{3}\frac{m}{s} \simeq 13{,}3\,m/s$

αδκ. 10

$\upsilon = 8 + 2t$ (S.I.)

α' τρόπος: $\upsilon_0 = 8\,m/s$ και $\alpha = 2\,m/s^2$ (τύπος: $\upsilon = \upsilon_0 + \alpha t$)

Μετώπως:

$\Delta t = (4-2)\,s = 2s$

$\upsilon_2 = 8 + 2\cdot 2 = 12\,m/s$

$S = \Delta x = \upsilon_2\,\Delta t + \frac{1}{2}\alpha\Delta t^2 = 12\cdot 2 + \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2^2 = 28m$

"αρχική" ταχύτητα (αρχή του χρονικού διαστήματος (2s) έως 4s

β' τρόπος

Η/W: να γίνει με διάγραμμα ⇒ με $\mathcal{E}_{τραπ.}$