

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΝΟΣΗΜΤΑ Σ.Μ.

- ΣΥΦΙΛΗ
- ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ
- ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΚΑΙ C
- AIDS
- ΕΡΠΗΤΑΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
- ΧΛΑΜΥΔΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ.Μ.Ν

- Ο Π.Ο.Υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΌΤΙ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ 40 ΕΚΑΤΟΜ. ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΚΑΙ 200 ΕΚΑΤΟΜ. ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Σ.Μ.Ν

- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΧ ΜΕ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ
- ΔΙΑΔΟΣΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΥΛΙΑΣ
- ΣΥΧΝΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ
- ΠΡΩΪΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΠΙΑ

- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ)
- ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
- ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
- ΝΟΣΗΣΗ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ
- ΑΓΝΟΙΑ

Α.ΣΥΦΙΛΗ



"Chancres on the penile shaft due to a primary syphilitic infection caused by *Treponema pallidum* 6803 lores", από Martin H. διαθέσιμο ως κοινό κτήμα



- ΑΙΤΙΟ: ΩΧΡΑ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΗ
- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
- ΕΙΔΗ: ΕΠΙΚΤΗΤΗ (ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠ'Ο ΑΤΟΜΟ) ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΗ (ΜΟΛΥΝΣΗ ΕΜΒΡΥΟΥ ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΑΠ'Ο ΤΗ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ)

- ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΟΣΟΥ: ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟ ΕΛΚΟΣ
- ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: ΟΙ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ
- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑ
- ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ
- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΟΥΣΑΣ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙ ΑΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

BAENNOPPOIA



Figure 9.4. Pyogenic granuloma (Baird et al.)

Β.ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ Ή ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ

- ΑΙΤΟ: ΓΟΝΟΚΟΚΚΟΣ
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: 1-7 ΗΜΕΡΕΣ
- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- ΔΥΣΟΥΡΙΑ
- ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ
- ΠΥΩΔΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

- 15%ΑΝΔΡΕΣ
- > 15% ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥΣ
- ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ


- ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗ ΚΟΛΜΥΡΪΟΥ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ Ή ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΟΛΙΣ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ
- ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ

Γ.ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β



ΑΙΤΙΟ

■ ΙΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β



ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

- ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ
- ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
- ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΑ (ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ)

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΔΥΝΟΥ

- ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
- ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
- ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΕΜΕΝΟΙ
- ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΤΕΡΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ
- ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
- ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ

- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
(ΓΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)
- ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΒΡΕΦΗ Ή ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
- ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δ. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C



- ΑΙΤΙΟ: ΙΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: 6-12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ: ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ε. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ AIDS



Εικόνα 1-15: Δερματικές εκδηλώσεις σε σάρκωμα Kaposi



ONOMASIA

- **AQUIRED IMMUNE DEFECIENCY**

SYNDROME...

AIDS

ΑΙΤΙΟ

- ΙΟΣ HIV
- HUMAN
- IMMUNODEFECIENCY
- **VIRUS..ΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ**
ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΕ ΣΕ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΤΟ 1981 ΣΤΙΣ ΗΠΑ
- ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Κ.Α

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

- ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ) ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

- Ο ΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΣΤΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ, ΣΤΙΣ ΚΟΛΠΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΣΑΛΙΟ, ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΑ, ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ, ΣΤΟ ΓΑΛΑ, ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ
- ΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

- ΔΕ ΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
- **ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ Ή ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ:**
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ. ΟΜΩΣ ΌΤΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΧΕΙ ΜΟΛΥΝΘΕΙ Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΤΕ Ο ΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΕΙ. **ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Ή ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ** (ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

- **ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ: ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΗΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΟΥ**
- **ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΖΩΗ, ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ**

ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΙΟΣ ΗΙV

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΙΛΙ
- ΧΕΙΡΑΨΙΑ
- ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ
- ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
- ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
- ΤΟΥΑΛΕΤΑ
- ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
- ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

- 'ΟΤΑΝ ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ
- ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
- ΘΑΛΑΣΑ
- ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
- ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΣΟΥ

- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: 1-2 ΜΗΝΕΣ
- ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟ 1/5 ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΧΑΜΗΛΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ, ΠΟΝΟΛΑΙΜΟΣ, ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ 20 ΗΜΕΡΕΣ. ΟΤΑΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΟΧΑ

ΦΟΡΕΑΣ

- ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΙΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ
- ΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ , ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- **ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ:** Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ. ΓΙ'ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙ



- **ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΝΑΥΤΙΚΟΙ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠ'Ο ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
- **ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ:** ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

- **ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ:**
ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ
ΑΠ'Ο 20 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΗΝΕΣ Ή ΚΑΙ 6
ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ, ΟΠΟΤΕ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

- ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ , ΜΑΣΚΩΝ, ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠ'Ο ΤΟ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- **ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ:
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΙΟ**
- ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ ΑΥΤΙΩΝ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΤΟΥΑΖ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΞΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΛΠ