

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

1) Να λύσετε τις εξισώσεις στο τετράδιό σας:

- α) $x - 8 = 12$ β) $x - 11 = 23$ γ) $10 - x = 7$
- δ) $15 - x = 9$ ε) $(5+3) - x = 4$ ζ) $(11 + 12) - x = 15$
- η) $x - (17 + 23) = 10$ θ) $x - (51 + 49) = 100$ ι) $(15+ 25) - x = 12 + 13$

2) Να λύσετε τις εξισώσεις στο τετράδιό σας:

α. $45,01 - X = 38$

β. $X - 35 = 120,301$

γ. $(6,25 - 2,3) - X = 0,020$

δ. $X - (12,3 - 4,3) = 10,1$

ε. $4\frac{5}{6} - X = \frac{5}{3}$

στ. $2\frac{3}{5} - X = 1\frac{5}{6}$

ζ. $(4\frac{1}{3} + 5\frac{2}{3}) - X = 2\frac{5}{8}$

η. $X - (\frac{7}{9} + \frac{1}{18}) = 4\frac{2}{3}$

θ. $X - 2\frac{2}{3} = 2,5$

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

1) Να λύσετε τις εξισώσεις στο τετράδιό σας:

- α) $x - 8 = 12$ β) $x - 11 = 23$ γ) $10 - x = 7$
- δ) $15 - x = 9$ ε) $(5+3) - x = 4$ ζ) $(11 + 12) - x = 15$
- η) $x - (17 + 23) = 10$ θ) $x - (51 + 49) = 100$ ι) $(15+ 25) - x = 12 + 13$

2) Να λύσετε τις εξισώσεις στο τετράδιό σας:

α. $45,01 - X = 38$

β. $X - 35 = 120,301$

γ. $(6,25 - 2,3) - X = 0,020$

δ. $X - (12,3 - 4,3) = 10,1$

ε. $4\frac{5}{6} - X = \frac{5}{3}$

στ. $2\frac{3}{5} - X = 1\frac{5}{6}$

ζ. $(4\frac{1}{3} + 5\frac{2}{3}) - X = 2\frac{5}{8}$

η. $X - (\frac{7}{9} + \frac{1}{18}) = 4\frac{2}{3}$

θ. $X - 2\frac{2}{3} = 2,5$
