

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΣΟΣ	ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	
Σαλμονελλώσεις	Μέσω του πεπτικού (από το στόμα κλπ)	
Χολέρα		
Σιγκέλλωση		
Αμοιβάδωση		
Οξυουρίαση		
Ηπατίτιδα Α	Μέσω του πεπτικού:	Με ξενιστές ή φορείς
	μεταδίδεται στο τέλος του σταδίου επώασης και τις 5-6 μέρες από την εμφάνιση του ίκτερου. Κόπρανα-άπλυτα χέρια-στόμα	
Γρίπη	Με σταγονίδια 2 μέρες πριν την εμφάνιση της νόσου και μια βδομάδα μετά.	
Πανώλης	Αρουραίοι, ψύλλοι, άνθρωποι	
Εξανθηματικός τύφος	Ψείρα	
Ελονοσία	Ανωφελές κουνούπι	
Κίτρινος πυρετός	Στεγόμυγα	
Λεϊσμανίαση	σκνίπα	
Σύφιλη	Συγγενής σύφιλη: μέσω του πλακούντα	Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
Βλεννόροια	Τα νεογνά μολύνονται κατά τον τοκετό	
Ηπατίτιδα Β	• Σεξουαλική επαφή • Αίμα και παράγωγα του • Περιγεννητικά	
Ηπατίτιδα C	• Σεξουαλική επαφή • Μετάγγιση αίματος και παραγώγων	
AIDS	• Σεξουαλική επαφή • Αίμα και παράγωγα του • Από τη μητέρα φορέα	
Έρπης γεννητικών οργάνων		
Χλαμύδια		

ΝΟΣΟΣ	ΑΙΤΙΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ
Σαλμονελλώσεις (γαστρεντερίτιδα)	Σαλμονέλλες (βακτήρια)	8-48 ώρες από τη λήψη μολυσμένης τροφής
Ηπατίτιδα Α	Ιός της Ηπατίτιδας Α	4-6 εβδομάδες
Γρίπη	Ιός της γρίπης (Α,Β,С)	1-3 ημέρες
Σύφιλη	Ωχρά σπειροχαίτη	
Βλενόρροια ή γονοκοκκική ουρηθρίτιδα	Γονόκοκκος	1-7 ημέρες
Ηπατίτιδα Β	Ιός (της Ηπατίτιδας Α)	
Ηπατίτιδα C	Ιός	6-12 εβδομάδες
AIDS	HIV (Ιός)	1-2 μήνες
Μελιταίος πυρετός	Βρουκέλλες (πχ. στο γάλα)	
Λοιμώξεις γαστρεντερικού	Σταφυλόκοκκος, κλωστηρίδιο αλλαντιάσεως κ.ά.	
Τροφικές δηλητηριάσεις	Ορισμένα είδη μανιταριών	

Επανάληψη σελ 19- 36 όλους τους ορισμούς. Θα γράψετε ένα τεστ.